

VÉDEKEZÉS AZ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA ÁLTAL TERJESZTETT ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG ELLEN.

Egyetlen védekezési mód: az amerikai szőlőkabóca irtása, gyérítése. (A betegség ellen nincs növényvédőszer.)

Teendők idén:

- tünetes tőkék megjelölése (A növényvédelmi hatóság jelölőszíne a zöldessárga szín. Ne ezt a színt használjuk jelölésre.)
- tünetes tőkék kivágása (gyökerestül) és elégetése. A gyökér eltávolítása azért fontos, mert a betegség ősszel visszahúzódik a tőkenyakba. Ha bent marad a gyökér, akkor tavasszal kihajt a növény betegen.
- szüret után rovarirtó szeres kezelés. November 20-ig engedélyezett szerek: Karate Zeon és Klartan.

Nagyon fontos a permetezés összehangolása a szomszédos ültetvények által. 7 kijelölt napon belül mindenki permetezzen!

Teendők metszés után:

- olajos lemosó permetezés magas olajtartalmú szerrel (mindegy, hogy növényi vagy ásványi olaj)

Törzstisztítás: legkésőbb májusban történjen meg. A kabóca a törzshajtásokat szereti, alulról indul.

A lárvák megjelenése június elejétől várható. L1, L2 és L3 lárvastádiumig nem fertőz a rovar. Ez alatt (június elejétől július közepéig) **2 védekezés** javasolt. A csontfehér színű lárvák első sorban az alsó levek fonákán keresendők.

A L1 lárva megjelenése általában a virágzáskor történik, ezért

- virágzáskor narancsolaj tartalmú készítménnyel permetezzünk. A narancsolaj is csak méhkímélően juttatható ki, azaz napnyugta után 1 órával kezdhető meg a permetezés és 23 óráig be kell fejezni.

A további (virágzáson túli) kezelések bármelyik engedélyezett szerrel történhetnek.

Július második felében sárga ragacslapok kihelyezése az ültetvényben a kifejlett egyedek megfigyelésére. 4 db kabóca/ ragacslap/ hét esetén még javasolt szüret előtt is permetezés. FONTOS! Az élelmezésügyi várakozási idő figyelembe vételével történjen a szerválasztás.

BIO művelés esetén is vannak használható szerek: olajok, természetes piretrin, spinozad.

Minden rovarirtó szeres peremetezés a szomszédok által összehangoltan, minél rövidebb időn belül (max. 7 nap) történjen, hogy a rovarok ne tudjanak elrepülni a permeteszer elől.

Aranyszínű sárgaság fehér szőlőtőkén:



Levelek a fonák felé pöndörödnek, sárgulnak, elszáradnak. A levelek későn hullanak le. Termés nincs vagy kevés és elfonnyad. A vesszők nem fásodnak be rendesen, zöldek maradnak, elvékonyodnak, gumyszerűvé válnak.

Aranyszínű sárgaság kék szőlőtőkén:



Levelek a fonák felé pöndörödnek, bordó színűek, elszáradnak. A levelek későn hullanak le. Termés nincs vagy kevés és elfonnyad. A vesszők nem fásodnak be rendesen, zöldek maradnak, elvékonyodnak, gumyszerűvé válnak.

Ezeket a tőkét ki kell vágni gyökerestül és el kell égetni őket.

Szőlőkabóca lárva (L1, L2, L3 stádium):

Levél fonákán szívogat, csontszínű. A tőke aljáról tart felfelé, elsősorban az alsó levelek fonákján keresendő. Emiatt nagyon fontos a törzstisztítás elvégzése. Az lárvák megjelenési ideje június eleje, a szőlővirágzás környékén. Ekkor kell az első rovarirtós permetezést végezni. Majd a kifejlett rovar megjelenése előtt, júliusban még egy rovarirtós permetezés javasolt az engedélyezett szerek valamelyikével.



Kifejlett amerikai szőlőkabóca:



Július közepétől sárga ragacslapok kihelyezésével figyelhető meg. 4 kabóca/ ragacslap/ hét esetén még a szüret előtt javasolt egy újabb (harmadik) rovarirtós permetezés. Szerválasztás: az É.V.I figyelembe vételével!

Az amerikai szőlőkabóca gyérítése mellett a fertőzött tőkék megjelölését és eltávolítását (gyökérrel együtt!!!) is el kell végezni. A kabóca mindig fertőzésmentesen tel el peteként, és csak akkor fertőződik meg, ha lárvaként egy fertőzött tőkén szívogat – ekkor képes továbbterjeszteni a betegséget az ültetvényben.